

***Grammodes bifasciata* (Petagna, 1787) i *Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758), dues espècies noves per a la Garrotxa, i noves citacions de *Xanthia ocellaris* (Borkhausen, 1789)**

***Grammodes bifasciata* (Petagna, 1787) and *Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758), two new species for La Garrotxa, and new records of *Xanthia ocellaris* (Borkhausen, 1789)**

Eduard Guzmán

Ronda Arraona, 81; E-08192 Sant Quirze del Vallès

Key words: Erebiidae, Noctuidae, Lepidoptera, La Garrotxa, Catalonia, Iberian Peninsula.

En diverses publicacions (Bellavista 1985; Bellavista & Guzmán 2004; Guzmán 1994, 2013a, 2013b) s'ha anat completant el cens d'espècies de Noctuoidea i altres macroheteròcers coneguts de la comarca de la Garrotxa. En la present nota s'hi afegeixen dues espècies noves i s'aporten citacions d'una altra que feia molts anys que no s'hi detectava.

***Grammodes bifasciata* (Petagna, 1787)**

Material estudiat. Garrotxa: Tortellà, riu Llierca (31TDG67, 200 m), 1 ♂, 8.IX.2015, 1 ♀, 22.IX.2015; Montagut de Fluvià, riu Llierca (31TDG67, 200 m), 1 ♂, 9.IX.2015, 3 ♂, 2 ♀, 21.IX.2015, 1 ♀, 23.IX.2015, 1 ♂, 3.X.2015.

Espècie tropical que també colonitza els encontorns del Mediterrani, on es troba preferentment en zones de bosc xeròfil, ambients esteparis i dunes costaneres. A Catalunya és més freqüent observar-la en zones properes al litoral, però també hi ha citacions de localitats situades més a l'interior, com Vic, Susqueda, Montsant o Banyoles.

***Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758)**

Material estudiat. Garrotxa: Besalú (31TDG77, 168 m), 1 ♀, 25.IX.2015.

Espècie subtropical amb una gran capacitat de dispersió pel seu comportament migratori. A Catalunya, a l'arribada de la migració, habitualment de mig agost a mig setembre, es pot trobar de manera més abundant per les zones costaneres, però se n'han arribat a trobar exemplars en zones tan interiors com la Cerdanya o la Vall d'Aran. Tant es poden trobar exemplars solitaris com estols extraordinàriament nombrosos. A finals d'agost de l'any 1990, a prop de Jerez de la Frontera (Cadís), durant una visita a una devesa, vam observar com, al pas dels carros, volaven milers d'exemplars (obs. pers.).

Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1789)

Material estudiat. Garrotxa: Montagut de Fluvià, 1 ♂, 18.X.2015.

Aprofitem aquesta nota per fer esment d'una nova troballa d'aquesta espècie, que no s'havia tornat a observar des de l'any 1985 (Guzmán 2013a).

Referències bibliogràfiques

- Bellavista, J. 1985. *Contribució a l'estudi dels noctuoidea (Lepidoptera) del Puigsacalm i d'altres indrets del Prepirineu oriental i aportació de noves dades per a un millor coneixement de llur distribució a Catalunya*. 608 pp. Tesi de Llicenciatura (inèdita). Departament de Zoologia. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona.
- Bellavista, J. & Guzmán, E. 2004. Els noctuids de la Garrotxa (Lepidoptera: Noctuidae). *Butll. Soc. Cat. Lep.*, 93: 5-30.
- Guzmán, E. 1994. Noctuidae de la Garrotxa. Noves espècies i troballes interessants. *Butll. Soc. Cat. Lep.*, 73: 52-53.
- Guzmán, E. 2013a. Seguiment dels noctuids a la zona de Tortellà (Alta Garrotxa), amb citacions d'espècies noves per a la Garrotxa (Lepidoptera: Noctuidae). *Butll. Soc. Cat. Lep.*, 104: 45-48.
- Guzmán, E. 2013b. Contribució al coneixement de la distribució dels macroheteròcers de la Garrotxa amb dades del quadrat UTM 31TDG67. *Butll. Soc. Cat. Lep.*, 104: 49-54.

Data de recepció: 25 d'octubre de 2015

Data d'acceptació: 10 de novembre de 2015