

Una nova troballa d'*Erebia neoridas* (Boisduval, 1828) forma *venturiensis* Chobaut, 1913 al Pirineu català (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae)

New locality of *Erebia neoridas* (Boisduval, 1828) *venturiensis* Chobaut, 1913 form in Catalonian Pyrenees (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae)

Josep Joaquim Pérez De-Gregorio, Ignasi Romañá Ferrer-Vidal & Martí Rondós i Casas
Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; E-08080 Barcelona

Key Words: *Erebia neoridas*, *venturiensis* form, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.

L'any 1980 (Masó & Pérez De-Gregorio 1980), el primer dels autors va donar compte de la presència al Pirineu Oriental català de la forma *venturiensis* Chobaut, 1913, d'*Erebia neoridas* (Boisduval, 1828). Aquesta forma individual, descrita del Mont Ventoux, Lozère (Massís Central de França), es caracteritza per presentar els ocel·ls de les bandes alars absents o reduïts a petits punts negres, un cas idèntic al que es dóna en la forma *castiliana* Romei, 1927 d'*Erebia zapateri* (Oberthur, 1875), endemisme del Sistema Central ibèric. En el treball del 1980 vam esmentar la troballa de dos exemplars femelles recollits al massís del Puigsacalm (Baixa Garrotxa, 31TDG46, 1.400 m), 19.IX.1976 (J.J. Pérez De-Gregorio leg.), i a Ribes de Freser (Ripollès, 31TDG38, 912 m), IX.1916 (A. Weiss leg., col. MZB).

Durant una sortida entomològica a la Serra de Busa (Solsonès, 31TCG86, 1.360 m), el 4.VIII.2003, a més a més d'altres Rhopalocera interessants, com els licènids *Aricia morronensis* (Ribbe, 1910) (sèrie) (lám. 2, fig. 2c i 2d) i *Agrodiaetus ainsae* Forster, 1961 (1 ex), vam tenir la sort de trobar, entre els nombrosos individus d'*Erebia neoridas* que volaven per la zona i eren atrets per les inflorescències dels panicals (*Eryngium campestris*), un mascle de la forma *venturiensis* (lám. 2, fig. 2a).

Aprofitem també per assenyalar la troballa al camí de l'ermita de Bastanist, Martinet (Baixa Cerdanya, 31TCG99, 950 m), el 15. VIII. 2003, d'una femella d'*E. neoridas* afectada d'albinisme a l'ala superior dreta (forma *albidice infecta*) (lám. 2, fig. 2b).

Referència bibliogràfica

Masó i Planas, A. & Pérez De-Gregorio, J.J. 1980. Notes sobre els lepidòpters de les comarques gironines. VII.- Presència al Pirineu gironí de la «*Erebia neoridas*» BdV., 1828, forma «*venturiensis*» Chobaut i noves dades de llur dispersió a Catalunya («Lep. Satyridae»). *Revista de Girona (Secció de Ciències)*, 93: 286-287.

Data de recepció: 12 de gener de 2004

Data d'acceptació: 2 de febrer de 2004



Fig. 1 *Calciphora punctinervis* (Constant, 1885), Tres Cantos (Madrid), ♂ ex larva, 2.VI.2002 (G. King leg. y det.) [foto: C. Hart].



Fig. 2 Adults de: **a**, *Erebia neoridas* (Boisduval, 1828) f. *venturiensis* Chobaut, 1913, Serra de Busa, Solsonès, ♂, 4.VIII.2003; **b**, *Erebia neoridas* (Boisduval, 1828) f. *albidice infecta*, Martinet, Baixa Cerdanya, ♀, 15.VIII.2003; **c** i **d**, *Aricia morronensis* (Ribbe, 1910), Serra de Busa, Solsonès, ♂, ♀, 4.VIII.2003 [foto: M. Rondós].